**ATIVIDADE ANTIMICROBIANA DE EXTRATOS, FRAÇÕES E COMPOSTO
ISOLADO DE *Euphorbia cotinifolia***

**Francielle P. REZENDE¹; Kamilla T. PEREIRA²; Marcos J. MARQUES³; Daniela A. C. de
PAULA⁴; Ingridy S. RIBEIRO⁵**

RESUMO

O aumento da resistência a antimicrobianos têm levado pesquisadores a buscarem novas moléculas bioativas provenientes de produtos naturais. Há poucos relatos na literatura sobre a atividade antimicrobiana de folhas de *Euphorbia cotinifolia*. Sendo assim, objetivo deste trabalho foi analisar a atividade antimicrobiana de seu extrato bruto, frações e composto isolado. Foi possível obter extrato, frações e composto isolado (galato de etila) com atividade antimicrobiana contra *M. luteus* e *S. aureus*.

INTRODUÇÃO

Atualmente, tem-se verificado um grande avanço científico envolvendo os estudos químicos e farmacológicos de plantas medicinais que visam obter novos compostos com propriedades terapêuticas. É crescente a conscientização em torno do grande potencial benéfico que os compostos naturais trazem aos seres humanos, principalmente no que diz respeito à atividade antimicrobiana.

O aumento da resistência aos antimicrobianos disponíveis tem atraído a atenção da comunidade científica para investigar novas drogas eficazes de origem

¹ Universidade Federal de Alfenas – Campus Alfenas. Alfenas/MG. E-mail: fran_rezendeff@hotmail.com
² Universidade Federal de Alfenas – Campus Alfenas. Alfenas/MG. E-mail: kamilla.teles@yahoo.com.br
³ Universidade Federal de Alfenas – Campus Alfenas. Alfenas/MG. E-mail: marques.prppg@gmail.com
⁴ Universidade Federal de Alfenas – Campus Alfenas. Alfenas/MG. E-mail: daniapchpa@gmail.com
⁵ Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais – Campus Muzambinho. Muzambinho /MG. E-mail: ingridy.ribeiro@muz.ifsuldeminas.edu.br

natural (BITU et al., 2012). Na seleção de novos compostos é desejável que eles tenham atividade em baixas concentrações, sejam de fácil aplicação e estáveis nas condições de processamento e armazenamento. Além disso, o composto e seus produtos de oxidação não podem ser tóxicos, mesmo em doses muito maiores das que normalmente seriam ingeridas no medicamento (DEPEINT et al., 2002).

Euphorbia cotinifolia é uma arbusto perene com ramos lenhosos e delicadas folhas ovais e com seiva leitosa e pequenas flores. As folhas mais velhas são bordô escuro, enquanto a folhagem nova tem um tom vermelho brilhante (BAILEY, 1949). Já foi utilizada para cauterizar feridas e é dada como um purgante em pequenas doses (MORTAN, 1962). Jayalakshmi et al. (2011) relataram atividade antimicrobiana de *E. cotinifolia* contra bactérias fitopatogênicas. O estudo fitoquímico das diferentes frações bioativas demonstrou a presença de flavonóides, terpenóides, taninos e esteróides. Algumas plantas do gênero *Euphorbia* têm sido utilizadas no tratamento popular de doenças de pele, verrugas, gonorréia, enxaqueca e parasitas intestinais (SINGLA; PATHAK, 1990).

O objetivo deste trabalho foi avaliar a atividade antimicrobiana do extrato etanólico de *Euphorbia cotinifolia* bruto, suas frações e composto isolado.

MATERIAL E MÉTODOS

A coleta das folhas de *Euphorbia cotinifolia* foi feita no município de Pouso Alegre-MG. Para a preparo do extrato bruto, foram pesados 10 g das folhas trituradas e solubilizadas em 200 mL de etanol 80% (v/v). O tempo de extração foi de 7 dias, em temperatura ambiente e ao abrigo da luz. O extrato foi filtrado em papel de filtro e concentrado a 45°C, em rotaevaporador.

Em seguida, o extrato bruto foi submetido à partição líquido-líquido com hexano, acetato de etila e água em funil de separação. A fração Acetato de Etila foi purificada em cromatografia em coluna flash, obtendo-se assim o composto isolado, que posteriormente foi identificado como galato de etila, por cromatografia líquida de alta eficiência, acoplada a espectrometria de massas.

A atividade antimicrobiana foi avaliada de acordo com CLSI (2005) contra os microrganismos: *Staphylococcus aureus* (ATCC 6538), *Micrococcus luteus* (ATCC 9341), *Bacillus cereus* (ATCC 11778), *Salmonella typhimurium* (ATCC 0028) e *Escherichia coli* (ATCC 25922). O método utilizado foi a Concentração Inibitória

Mínima por microdiluição em placa (CIM), em caldo BHI. A leitura do resultado foi realizada por meio da adição de resazurina (0,01%). Em seguida, as concentrações consideradas inibitórias foram submetidas ao teste de Concentração Bactericida Mínima (CBM), pelo cultivo em meio ágar BHI.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Foi possível observar que tanto o extrato bruto quanto as frações e composto isolado apresentaram atividade antimicrobiana (Tabela 1). Os microrganismos *Bacillus cereus* e *E. coli* mostraram-se resistentes às amostras testadas. O extrato bruto foi eficiente contra *M. luteus* e *S. tiphymurium*. A fração hexânica não demonstrou atividade inibitória nas concentrações testadas. A fração acetato de etila apresentou CIM de 31,25 µg/mL contra *S. aureus*. O composto isolado da fração acetato de etila, denominado de galato de etila, apresentou atividade contra *M. luteus* e *S. aureus*. A ação inibitória do composto isolado foi mais eficiente que o extrato bruto para *M. luteus*.

Tabela1. Concentrações Inibitórias Mínimas (CIM) do extrato bruto de *Euphorbia cotinifolia*, frações e composto isolado, em µg/mL

Amostra	<i>M. luteus</i>	<i>S. aureus</i>	<i>B. cereus</i>	<i>S. tiphymurium</i>	<i>E. coli</i>
Extrato bruto	250	-	-	250	-
Fração Hexano	-	-	-	-	-
Fração Ac. Etila	-	31,25	-	-	-
Fração Aquosa	-	1000	-	-	-
Galato de Etila	125	1000	-	-	-

- atividade não detectada nas concentrações utilizadas

Para a Concentração Bactericida Mínima (CBM), somente o composto isolado galato de etila apresentou atividade, contra *Micrococcus luteus*, a 125 µg/mL.

Segundo Holets et al. (2002), extratos que apresentarem CIM menores que 100 µg/mL, podem ser considerados com boa atividade antimicrobiana, CIM entre 100 – 500 µg/mL, moderadamente ativos, entre 500 – 1000 µg/mL são pouco ativos e maior de 1000 µg/mL, são considerados como substâncias inativas.

Ribeiro et al. (2014), avaliaram a atividade antimicrobiana de extratos de caule, raiz, fruto e folha de *Euphorbia cotinifolia*. Dentre os microorganismos

testados, as bactérias *Bacillus subtilis*, *Bacillus cereus*, *Micrococcus luteus*, *Staphylococcus aureus* e *Proteus mirabilis* mostraram-se sensíveis. *M. luteus* foi o mais sensível, apresentando halos entre 15 a 20 mm. Pelo método de microdiluição em placa o microrganismo mais sensível foi *M. luteus* sendo que os valores de CIM estiveram abaixo de 6,25 mg/mL.

O composto isolado galato de etila (Figura 1), é um composto fenólico encontrado naturalmente em um grande número de espécies de plantas entre as quais se destacam: *Phyllanthus urinaria* (SANTOS et al., 1999), *Pistacia integerrima* (MEHLA et al., 2013), *Lagerstroemia speciosa* (GAO et al., 2010), *Alchornea trewioides* (QIN et al., 2012), *Hamamelis virginiana* (KOSTALOVA et al., 2001) e também no vinho tinto onde são encontrados em abundância compostos fenólicos entre estes os galatos (CLIFFORD et al., 1996). Este é o primeiro relato de galato de etila em plantas do gênero *Euphorbia*.

Figura 1: Estrutura molecular do galato de etila, compostos isolado de *Euphorbia cotinifolia*.

Dados da literatura têm demonstrado que compostos fenólicos como os galatos possuem diversas propriedades biológicas, como efeito antioxidante (HAWAS, 2007; ZHANG et al., 2008), atividades antiparasitária (CALDERON et al., 2006), anticâncer (KIM et al., 2012), antimicrobiana (SHIBATA et al., 2005) e na prevenção de choque séptico (GOTES et al., 2012).

CONCLUSÕES

Foi possível concluir que o extrato etanólico de folhas de *Euphorbia cotinifolia* apresentou atividade antimicrobiana. Do fracionamento do extrato, obteve-se a fração acetato de etila, também biotiva. A sua purificação por cromatografia em

coluna flash permitiu que se isolasse a substância galato de Etila, que também demonstrou atividade antimicrobiana contra *M. luteus* e *S. aureus*. Sendo assim, *Euphorbia cotinifolia* pode ser considerada um produto natural fonte de compostos bioativos, cuja composição química pode ser utilizada como modelo para desenvolvendo de novas drogas antimicrobianas.

REFERÊNCIAS

- BAILEY, L. H. Manual of Cultivated Plants, Revised edition. **McMillan**, New York, v. 1, p. 88, 1949.
- BITU, V. et al. Phytochemical screening and antimicrobial activity of essential oil from *Lippia gracilllis*. **Revista Brasileira de Farmacognosia**, v. 22, n. 1, p. 69-75, 2012.
- CALDERON, A. I. et al. Evaluation of larvicidal and in vitro antiparasitic activities of plants in a biodiversity plot in the Altos de Campana National Park, Panama. **Pharmaceutical Biology**, v. 44, n. 7, p. 487-498, out 2006.
- CLIFFORD, A. J. et al. Delayed tumor onset in transgenic mice fed an amino acid-based diet supplemented with red wine solids. **American Journal of Clinical Nutrition**, v. 64, n. 5, p. 748-56, nov 1996.
- CLSI. **Metodologia dos Testes de Sensibilidade a Agentes Antimicrobianos por Diluição para Bactéria de Crescimento Aeróbico**: Norma Aprovada - Sexta Edição. *Norma M7-A6*. Vol. 23., 2005.
- DEPEINT, F. et al. Evidence for consistent patterns between flavonoid structures and cellular activities. **Proceedings of the Nutrition Society**, Cambridge, v. 61, p..97-103, 2002.
- GAO, S. et al. LC-MS/MS method for the simultaneous determination of ethyl gallate and its major metabolite in rat plasma. **Biomedical Chromatography**, v. 24, n. 5, p. 472-8, maio 2010.
- GOTES, J. et al. Benefits of ethyl gallate versus norepinephrine in the treatment of cardiovascular collapse in *Pseudomonas aeruginosa* septic shock in dogs. **Critical Care Medicine**, v. 40, n. 2, p. 560-72, fev 2012.
- HAWAS, U. W. Antioxidant activity of brocchlin carboxylic acid and its methyl ester from *Chrozophora brocchiana*. **Natural Products Research**, v. 21, n. 7, p. 632-40, jun 2007.

HOLETZ, F. B. et al. Screening of some slants used in the Brazilian folk medicine for the treatment of infectious diseases. **Memórias do Instituto Oswaldo Cruz**, v. 97, n. 7, p. 1027-1031, 2002.

KIM, W. H. et al. Ethyl Gallate Induces Apoptosis of HL-60 Cells by Promoting the Expression of Caspases-8, -9, -3, Apoptosis Inducing Factor and Endonuclease G. **International Journal of Molecular Science**, v. 13, n. 9, p. 11912-22, 2012.

KOSTALOVA, D. et al. Polyphenol compounds from *Hamamelis virginiana L.* **Ceská a Slovenská Farmacie**, v. 50, n. 1, p. 51-3, jan 2001.

MEHLA, K. et al. Ethyl gallate attenuates acute lung injury through Nrf2 signaling. **Biochimie**, v. 95, n. 12, p. 2404-14, dez 2013.

MORTAN, J.F. Ornamental plants with toxic and/or irritant properties II. **Florida State Horticultural Society**, p. 484-488, 1962.

QIN, R. D. et al. Phenolic acid derivatives from *Alchornea trewioides*. **Yao Xue Xue Bao**, v. 47, n. 7, p. 926-9, jul 2012.

SANTOS, A. R. et al. The involvement of K⁺ channels and Gi/o protein in the antinociceptive action of the gallic acid ethyl ester. **European Journal of Pharmacology**, v. 379, n. 1, p. 7-17, ago 1999.

SHIBATA, H. et al. Alkyl gallates, intensifiers of beta-lactam susceptibility in methicillin-resistant *Staphylococcus aureus*. **Antimicrobial Agents Chemotherapy**, v. 49, n. 2, p. 549-55, fev 2005.

SINGLA, A.K.; PATHAK, K. Phytoconstituents of *Euphorbia species*. **Fitoterapia**, v. 61, p. 483-516, 1990.

RIBEIRO, G. E. Triagem fitoquímica, atividade antimicrobiana, antioxidante e citotoxicidade de extratos hidroetanólicos de *Euphorbia cotinifolia* (Leiteiro vermelho). 2014. 65p. Dissertação (Mestrado). Universidade Federal de Alfenas, Alfenas-MG.

JAYALAKSHMI, B et al. Phytochemical analysis and antibacterial activity of *Euphorbia cotinifolia* Linn. leaf extracts against phytopathogenic bacteria. **Journal of Pharmacy Research**, v. 4, n. 10, p. 3759 - 3762, 2011.

ZHANG, W. K. et al. Chemical constituents with antibacterial activity from *Euphorbia sororia*. **Natural Products Research**, v. 22, n.4, p. 353-359, Mar. 2008.